

# 工共 212 工業数学 IV

## 第 10 回

### 複素積分 (2)

## 複素積分 (復習) (p.159)

**定義 5.6**  $D \subset \mathbb{C}$ ,  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  で, 曲線  $C : z = z(t)$  ( $a \leq t \leq b$ ) が  $D$  に含まれているとき,  $f(z)$  の曲線 (積分路)  $C$  に沿った複素積分を以下によって定義する:

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt$$

- $\int_a^b f(z(t))z'(t)dt$  は,  $[a, b]$  を  $a = t_0, t_1, \dots, t_N = b$  と分割したときの和  $\sum_{i=0}^{N-1} f(z(\tau_i))z'(\tau_i)(t_{i+1} - t_i)$  の, 分割を細かくした極限 (ただし  $\tau_i \in [t_i, t_{i+1}]$ ) として定義されている
- 実は,  $\tau_i \in [t_i, t_{i+1}]$  をどのように取っても極限が同じ値になるということが, 積分の定義に含まれている

•  $z'(\tau_i)(t_{i+1} - t_i) \simeq z(t_{i+1}) - z(t_i)$  だから…

•  $\int_a^b f(z(t))z'(t)dt$  は,

$$\sum_{i=0}^{N-1} f(z(\tau_i))(z(t_{i+1}) - z(t_i))$$

の、分割を細かくしたときの極限と考えることもできる (教科書 168~170 ページ); 実は、この定義の方が使い勝手がよい。

## 曲線のパラメータ変換 (1)

- $z : [a, b] \rightarrow D$  を滑らかな曲線  $C$  とし,  $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$  を  $\varphi' > 0$  を満たす連続微分可能な関数とする. このとき, 合成関数  $z \circ \varphi$  はやはり滑らかな曲線となる.
- $\varphi' > 0$  であるから,  $\varphi$  は微分同相写像と呼ばれるものになっている

## 曲線のパラメータ変換 (2)

- 微分同相写像を使って曲線のパラメータを取り換えることをパラメータ変換という
- 曲線  $C$  を  $C : z = z(t), a \leq t \leq b$  に対し,  $w(s) = z(\varphi(s))$  とおき, 曲線  $\Gamma$  を  $\Gamma : z = w(s), c \leq s \leq d$  と定義する.

## 複素積分 (5) (p.161)

**定理 5.4** 以上で述べたパラメータ変換に対し、  
次式が成立する:

$$\int_C f(z)dz = \int_{\Gamma} f(z)dz$$


## 証明

$$\begin{aligned}\int_{\Gamma} f(z)dz &= \int_c^d f(z(\varphi(s)))(z \circ \varphi)' ds \\ &= \int_c^d f(z(\varphi(s)))z'(\varphi(s))\varphi'(s)ds \\ &= \int_a^b f(z(t))z'(t)dt = \int_C f(z)dz\end{aligned}$$


ただし 3 行目第 1 式で  $t = \varphi(s)$  とおき定理 5.2(p.158) を使った.





ここで, 実数値関数の定積分に関する事実をいくつか復習しておく.



$$\int_a^b (f + g)(x) dx = ?$$





$$\int_a^b (f + g)(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$




$$\int_a^b g(x) dx = ?$$


$$\int_a^b 0.5f(x)dx = 0.5 \int_a^b f(x)dx$$



一般に, 
$$\int_a^b \alpha f(x)dx = \alpha \int_a^b f(x)dx$$



$$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \quad \text{VS} \quad \int_a^b f(x)dx$$



$$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

$\int_b^a f(x)dx$  は次のように定義されていた:

$$\int_b^a f(x)dx = - \int_a^b f(x)dx$$



まとめて…

$$\begin{aligned} & \int_a^b \alpha_1 f(x) + \alpha_2 g(x) dx \\ &= \alpha_1 \int_a^b f(x) dx + \alpha_2 \int_a^b g(x) dx \\ & \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx \\ & \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

これらは、複素積分  
でも、ほとんどその  
まま成り立つ。

## 複素積分 (6) (p.162)

**定理 5.5 (1)**  $f, g$  は  $D$  で定義された連続関数で,  $C$  は  $D$  に含まれる曲線としたとき, 以下が成り立つ:  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ,

$$\int_C \alpha f(z) + \beta g(z) dz = \alpha \int_C f(z) dz + \beta \int_C g(z) dz$$



証明 積分の定義に戻れば

$$\begin{aligned} & \int_C (\alpha f(z) + \beta g(z)) dz \\ &= \int_a^b (\alpha f(z(t)) + \beta g(z(t))) z'(t) dt \\ &= \int_a^b \alpha f(z(t)) z'(t) dt + \int_a^b \beta g(z(t)) z'(t) dt \\ &= \alpha \int_C f(z) dz + \beta \int_C g(z) dz \end{aligned}$$

## 複素積分 (7) (p.162)

**定理 5.5 (2)**  $z : [a, b] \rightarrow D$  の定義域  $[a, b]$  を 2 分し, 前半を  $[a, c]$ , 後半を  $[c, b]$  とする. また,  $C_1 : z = z(t), a \leq t \leq c$ ,  $C_2 : z = z(t), c \leq t \leq b$  とし,  $C = C_1 + C_2$  と書くと, 次が成り立つ:

$$\int_{C_1+C_2} f(z)dz = \int_{C_1} f(z)dz + \int_{C_2} f(z)dz$$





実関数の積分とまったく同じ理由から、

$$\int_{C_1+C_2} f(z)dz = \int_{C_1} f(z)dz + \int_{C_2} f(z)dz$$

## 複素積分 (8) (p.162)

**定理 5.5 (3)**  $C$  の向きを逆にした曲線を  $-C$  と書くと, 次が成り立つ:

$$\int_{-C} f(z)dz = - \int_C f(z)dz$$



$$\int_b^a f(x)dx = - \int_a^b f(x)dx \text{ と同様}$$



図などを見ればすぐにわかる結果なので、この講義では詳しい計算には立ち入らない。興味がある者は教科書 pp. 162~163 の証明を参照せよ。

## 演習 10-1

空欄を埋め, 正しいと思う方を選択せよ.

## 演習 10-1 解答 (1)

$$C_1 : z(t) = e^{i(t-\pi)} (0 \leq t \leq \pi), f(z(t)) = e^{-i(t-\pi)},$$

$$z'(t) = ie^{i(t-\pi)},$$

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_0^{\pi} e^{-i(t-\pi)} ie^{i(t-\pi)} dt = \int_0^{\pi} i dt;$$

$$\int_{C_1} f(z) dz = i\pi$$

## 演習 10-1 解答 (2)

$$C_2 : z(t) = e^{i(\pi-t)} (0 \leq t \leq \pi), f(z(t)) = e^{-i(\pi-t)},$$
$$z'(t) = -ie^{i(\pi-t)},$$

$$\int_{C_2} f(z) dz = \int_0^{\pi} e^{-i(\pi-t)} (-ie^{i(\pi-t)}) dt = \int_0^{\pi} -i dt;$$

$$\int_{C_2} f(z) dz = -i\pi. \int_{C_1} f(z) dz \text{ と } \int_{C_2} f(z) dz \text{ は一}$$

致 **しない**

## 演習 10-1 解答 補足

複素関数の積分は一般に積分路に依存する. しかし, 後で述べるように, 正則関数の積分は積分路によらず, 端点のみで定まる.

次に、複素積分を実部と虚部に分けることを考える.

$$f(z) = u(z) + iv(z)$$

$$z(t) = x(t) + iy(t)$$

とすると...

$$\begin{aligned} & \int_a^b f(z(t))z'(t)dt \\ &= \int_a^b (u(z(t))x'(t) - v(z(t))y'(t))dt \\ & \quad + i \int_a^b u(z(t))y'(t) + v(z(t))x'(t)dt \end{aligned}$$

となるから…

以下のように記号を定義すると…

$$\begin{aligned}\int_C u dx &= \int_a^b u(z(t))x'(t)dt \\ \int_C v dx &= \int_a^b v(z(t))x'(t)dt \\ \int_C u dy &= \int_a^b u(z(t))y'(t)dt \\ \int_C v dy &= \int_a^b v(z(t))y'(t)dt\end{aligned}$$



## 複素積分 (9) (p.164)

**定理 5.6** 以上の定義のもとで以下の等式が成り立つ:

$$\int_C f(z)dz = \int_C (udx - vdy) + i \int_C (udy + vdx)$$

これは機械的に記号を書き直しただけ.

- 定理 5.6 は教科書でグリーンの公式に関する議論をするとき使う
- この講義ではグリーンの公式は取り扱わない

## 複素積分 (10)

**定義** 曲線  $C : z = z(t), a \leq t \leq b$  の弧長  $L$  を以下によって定義する:

$$L = \int_a^b |z'(t)| dt$$

## 複素積分 (11) (p.165)

**定義 5.7**  $a \leq b$  のとき, 弧長による積分を以下のように定義する:

$$\int_C f(z)|dz| = \int_a^b f(z(t))|z'(t)|dt$$

## 複素積分 (12) (p.166)

**定理 5.7** 曲線の弧長を  $L$  とし,  $C$  上で  $|f(z)| \leq M$  が成り立つものとする, 以下の不等式が成立する:

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| |dz| \leq ML$$

教科書 p.166 における定理 5.7 の証明は不十分;  $a \leq b$  としたとき, 以下を順に示す必要がある.

(1) 実数値関数  $p(x)$  に関し, 
$$\left| \int_a^b p(x) dx \right| \leq \int_a^b |p(x)| dx$$

(2) 複素関数  $f(z)$  に関し,

$$\left| \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(z(t))| |z'(t)| dt$$

小さい字で証明を書いておくので興味がある者だけ読んでほしい.

$$(1) p^+(x) = \begin{cases} p(x), & p(x) \geq 0 \\ 0, & p(x) < 0 \end{cases}, p^-(x) = \begin{cases} 0, & p(x) \geq 0 \\ -p(x), & p(x) < 0 \end{cases}$$

と定義すると,  $p(x) = p^+(x) - p^-(x)$  であり, かつ  $|p(x)| = p^+(x) + p^-(x)$ . ところで,  $\int_a^b p(x)dx = \int_a^b p^+(x)dx - \int_a^b p^-(x)dx$  だから,

$$|\int_a^b p(x)dx| \leq |\int_a^b p^+(x)dx| + |\int_a^b p^-(x)dx| \text{ となるが, } p^+(x) \geq 0, p^-(x) \geq 0 \text{ に注意すると, } |\int_a^b p^+(x)dx| = \int_a^b p^+(x)dx, |\int_a^b p^-(x)dx| = \int_a^b p^-(x)dx \text{ であり, よって } |\int_a^b p(x)dx| \leq \int_a^b p^+(x)dx + \int_a^b p^-(x)dx = \int_a^b (p^+(x) + p^-(x))dx = \int_a^b |p(x)|dx \text{ が成り立つ.}$$

(2) 記法の簡単のため,  $f(z(t))z'(t)$  を  $g(t)$  と書く.  
 $|\int_a^b g(t)dt| \leq \int_a^b |g(t)|dt$  が示すべき不等式である.  
 $\int_a^b g(t)dt = re^{i\theta}$  と書くことにすると,  $|\int_a^b g(t)dt| = e^{-i\theta} \int_a^b g(t)dt = \int_a^b e^{-i\theta} g(t)dt$  で,  $\int_a^b e^{-i\theta} g(t)dt$  が実数であることから, さらに  $|\int_a^b g(t)dt| = \int_a^b \operatorname{Re}(e^{-i\theta} g(t)) dt$  となる.  $\operatorname{Re}(e^{-i\theta} g(t))$  は実数値関数だから, (1) が使えて,  $|\int_a^b \operatorname{Re}(e^{-i\theta} g(t)) dt| = \int_a^b \operatorname{Re}(e^{-i\theta} g(t)) dt \leq \int_a^b |\operatorname{Re}(e^{-i\theta} g(t))| dt \leq \int_a^b |g(t)| dt$  となる (ただし  $|e^{-i\theta}| = 1$  であることと,  $|\operatorname{Re} g(t)| \leq |g(t)|$  となることを使った). これらをまとめると, 示すべき不等式  $|\int_a^b g(t)dt| \leq \int_a^b |g(t)|dt$  が得られる.



定理 5.7 の証明 以上を踏まえて定理の証明に戻ると,

$$\begin{aligned} \left| \int_C f(z) dz \right| &= \left| \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt \right| \\ &\leq \int_a^b |f(z(t))| |z'(t)| dt \leq M \int_a^b |z'(t)| dt \\ &= ML \end{aligned}$$

- 項別積分に関する定理 5.8 (p.167) については詳しい説明を省く.
- 関数の級数が良い性質を持つときには, 無限和と積分の順序の交換が許される:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_C f_n(z) dz = \int_C \left( \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z) \right) dz$$

という程度の理解でよい.

## 不定積分 (1) (p.170)

**定義 5.8** 領域  $D$  で定義された連続関数  $f(z)$  に対し,  $\forall z \in D, F'(z) = f(z)$  となる関数を  $f(z)$  の**原始関数**という.

## 不定積分 (2) (p.171)

**定理 5.10** 領域  $D$  で定義された連続関数  $f(z)$  が原始関数  $F(z)$  を持つとき,  $D$  内の曲線  $C : z = z(t), a \leq t \leq b$  に対して次式が成り立つ:

$$\int_C f(z) dz = F(z(b)) - F(z(a))$$

## 証明

$$\begin{aligned} F(z(b)) - F(z(a)) &= \int_a^b \frac{d}{dt} F(z(t)) dt \\ &= \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt = \int_C f(z) dz \end{aligned}$$

始点を  $\alpha$ , 終点を  $\beta$  とする曲線  $C$  をどのように取っても  $\int_C f(z)dz$  の値が**同じ値となる場合**に限り, この積分を  $\int_{\alpha}^{\beta} f(z)dz$  と書く.

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(z)dz \stackrel{\text{def}}{=} \int_C f(z)dz$$

積分が積分路  $C$  に**依存しない**場合に限り使う記号

( $\stackrel{\text{def}}{=}$  は左辺が右辺で定義されるという意味)

## 不定積分 (3) (p.171)

**系 5.1** 領域  $D$  で定義された連続関数  $f(z)$  が原始関数  $F(z)$  を持つとき,  $D$  内の閉曲線  $C : z = z(t), a \leq t \leq b$  に対して次式が成り立つ:

$$\int_C f(z)dz = 0$$

## 証明

$$\begin{aligned} F(z(b)) - F(z(a)) &= \int_a^b \frac{d}{dt} F(z(t)) dt \\ &= \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt = \int_C f(z) dz \end{aligned}$$

であるが、閉曲線だから  $z(b) = z(a)$  であり、したがって  $\int_C f(z) dz = 0$ .



$C$  が閉曲線のとき、教科書によつては、 $\int_C f(z)dz$  のことを  $\oint_C f(z)dz$  と書くことがある。

## 不定積分 (4) (p.172)

**定理 5.11** 領域  $D$  で定義された連続関数  $f(z)$  が原始関数  $F(z)$  を持ち,  $g(z)$  が正則ならば,  $D$  内の 2 点  $\alpha, \beta$  に対して次式が成り立つ:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(z)g(z)dz = \left[ F(z)g(z) \right]_{\alpha}^{\beta} - \int_{\alpha}^{\beta} F(z)g'(z)dz$$

証明  $F(z)g(z)$  は微分可能で,

$\frac{d}{dz}(F(z)g(z)) = f(z)g(z) + F(z)g'(z)$  である. よつて,  $F(z)g(z)$  は  $f(z)g(z) + F(z)g'(z)$  の原始関数であり,  $C: z = z(t), a \leq t \leq b$  を  $z(a) = \alpha, z(b) = \beta$  とするようにとると, 定理 5.10 により, 積分路  $C$  の取り方によらず, 以下が成り立つ.

$$\int_C (f(z)g(z) + F(z)g'(z)) dz = [F(z)g(z)]_{\alpha}^{\beta}$$

左辺第 2 項を右辺に移項すると定理 5.11 が得られる.

## 不定積分 (5) (p.172)

**定義 5.9** 領域  $D$  で定義された連続関数  $f(z)$  に対し,  $D$  内の点  $\alpha$  を固定して  $z$  を動かしたとき,  $\alpha$  と  $z$  を結ぶ  $D$  内の曲線  $C$  によって定義された積分  $\int_C f(\zeta)d\zeta$  の値が  $\alpha$  と  $z$  だけから決まり, 曲線  $C$  には依存しないとき, これを  $z$  の関数と見做して,  $f(z)$  の不定積分といい,  $F(z) = \int_{\alpha}^z f(\zeta)d\zeta$  と書く.

ゼータ



ギリシア文字

## 不定積分 (6) (p.173)

**定理 5.12** 領域  $D$  で定義された連続関数  $f(z)$  の不定積分  $F(z)$  が存在すれば,  $F(z)$  は正則で,  $f(z)$  の原始関数である.

証明の概略  $\epsilon - \delta$  論法を避けて概略のみを述べる.

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_z^{z+h} (f(\zeta) - f(z)) d\zeta \right| \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_z^{z+h} |f(\zeta) - f(z)| d\zeta \end{aligned}$$

であるが,  $f(z)$  が連続だから,  $|h|$  を小さくすれば, 最後の不等式の右側の項はいくらでも小さくなる. よって,  $F(z)$  は微分可能 (正則) で,  $F'(z) = f(z)$  である.

## 不定積分 (7) (p.174)

**定理 5.13** 領域  $D$  で定義された連続関数  $f(z)$  が  $D$  内の任意の閉曲線  $C$  に対して


$$\int_C f(z)dz = 0$$

となれば,  $f(z)$  は不定積分を持つ.



## 証明

2点  $\alpha$ ,  $\beta$  を結ぶ 2 個の積分路  $C_1$ ,  $C_2$  と,  $C_2$  の向きを逆転した  $-C_2$  を取る.  $\int_{-C_2} f(z)dz = -\int_{C_2} f(z)dz$  である.  $C_1$  と  $-C_2$  を連結した閉曲線を  $C_1 + (-C_2)$  と書く.



$0 = \int_{C_1 + (-C_2)} f(z)dz$  (仮定より)  $= \int_{C_1} f(z)dz + \int_{-C_2} f(z)dz = \int_{C_1} f(z)dz - \int_{C_2} f(z)dz$  だから,  $\int_{C_1} f(z)dz = \int_{C_2} f(z)dz$  となり, 積分が積分路によらず定まるから  $f(z)$  は不定積分を持つ.

今までの結果をまとめると…

## 不定積分 (8) (p.174)

**定理 5.14** 領域  $D$  上の連続関数  $f(z)$  について以下は同値:

- (1)  $f(z)$  は  $D$  で不定積分を持つ
- (2)  $\exists F(z), F'(z) = f(z)$
- (3)  $C$  が閉曲線なら  $\int_C f(z)dz = 0$

証明 (3) $\Rightarrow$ (1) は定理 5.13, (1) $\Rightarrow$ (2) は定理 5.12, (2) $\Rightarrow$ (3) は系 5.1 だから, これらはすべて既に証明されている.

## 演習 10-2

空欄を埋め, 正しいと思う方を選択せよ.

(次に述べる解答では, 解答を見やすくするため, 言い回しを若干変え, かつ積の記号  $\cdot$  や括弧を書き加えることがある.)

## 演習 10-2 解答 (1)

$C_1$  に対し,  $f(z(t)) = t$ ,  $z'(t) = 1$ ,

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_0^1 t \cdot 1 dt = 1/2.$$

$C_2$  に対し,  $f(z(t)) = 1 + it$ ,  $z'(t) = i$  だから,

$$\int_{C_2} f(z) dz = \int_0^1 (1 + it) i dt = i - 1/2.$$

## 演習 10-2 解答 (2)

$C_3$  に対し,  $f(z(t)) = (1+i)t$ ,  $z'(t) = (1+i)$ ,

$$\int_{C_3} f(z) dz = \int_0^1 (1+i)t (1+i) dt = i.$$

$\int_{C_1+C_2} f(z) dz = i$ ,  $\int_{C_3} f(z) dz = i$  となり, これらは一致する.  $F(z) = z^2/2$  とおくと,  $F'(z) = z$  であり,  $f(z)$  は原始関数を持つ.  $\int_C f(z) dz$  は積分路に依存しない.